

骨粗しょう症治療の前に、 歯科健診を受けてください！

骨粗しょう症の治療に使われるビスフォスフォネート薬剤（BP 薬剤）を服用した方が、歯科治療後に、副作用によって「あごの骨が腐る」「歯髄が炎症を起こす」「感染症が重くなる」ことが報告されています（日本口腔外科学会の調査）。

骨粗しょう症の治療を受ける予定の方は、歯科治療を受ける時には注意しましょう！

緊急の歯科
治療が必要
になった時



骨粗しょう症の治療薬を投与していると



治療後、まれに副作用によりアゴの骨が壊死してしまう場合があります。

骨が壊死した場合、骨の回復は極めて困難です…。

リスクを伴う治療になりますが、それをご理解の上で治療を受けられますか？

必要な処置が受けられず
困ります

安心して骨粗しょう症治療を受けるために

治療開始前に
必ず歯科健診を
受けましょう！

歯科治療は
終わらせて
おきましょう！

定期管理を受けて
お口の状態を健康に
保ちましょう！

KOMIYA DENTAL NEWSLETTER

2009年
月号



新年 明けまして おめでとうございます。本年も皆様の健康をサポート出来るようスタッフ一同頑張ります。

不況が長引き、何となく元気もなくなる昨今ですが、『明るく、楽しく、元気よく』暮らしたいものです。その為にも『健康』でいる事が大切なのではないかと思います。医科でも歯科でも定期的なチェックを受け、『まず予防、そして早期発見、早期治療』を心がけたいものです。何かあったらなんとかしてもらえる時代ではなくなってしまうのでしょうか。自分の健康管理は自分で積極的にしなければならいのでしょうか。

院長も気を付けねばと思っているのですが...『わかつちやるけど やめられない...』を少しずつ減らさなければ...

毎月保険証の提示に御協力頂きありがとうございます。
このニュースレターは当院のオリジナルで毎月発行しています。



・診療日の変更はありません。



☎ 03-5699-8888

〒125-0041 葛飾区東金町1-45-2 ハヤシ駅前ビル2F

「インターネット予約確認サービス URL」 <http://www.dent-s.net/komiya/>
ホームページアドレス <http://www.wahaha.gr.jp> E-mail dental@wahaha.gr.jp